

## Тест-вопросы для проверки уровня знаний ср. мед.работников по ВИЧ-инфекции .

1. СПИД- это...
  - 1-конечная стадия ВИЧ-инфекции.
  - 2-синоним ВИЧ-инфекции
  - 3- самостоятельное заболевание
  - 4-начальная стадия ВИЧ-инфекции
- 2 Источником ВИЧ-инфекции являются...
  - 1-кровососущие насекомые
  - 2-больные с диагнозом «СПИД».
  - 3-бессимптомные носители ВИЧ.
  - 4-люди с иммунодефицитом
- 3.Биологические жидкости, концентрация ВИЧ в которых достаточна для заражения...
  - 1-грудное молоко.
  - 2-слюна
  - 3-кровь.
  - 4-моча
- 4.ВИЧ погибает...
  - 1-при высушивании.
  - 2-при замораживании
  - 3-при кипячении.
  - 4-при нагревании
- 5.Пути передачи ВИЧ-инфекции...
  - 1-пищевой
  - 2-парентеральный.
  - 3-контактно-бытовой
  - 4-вертикальный.
6. Обследование на ВИЧ-инфекцию необходимо проводить...
  - 1- наркоманам.
  - 2- всем стационарным больным
  - 3- беременным.
  - 4- водителям- дальнобойщикам
7. Наиболее частые симптомы при ВИЧ-инфекции...
  - 1- тошнота, рвота
  - 2- лихорадка.
  - 3- увеличение лимфатических узлов.
  - 4- нарушение координации движений
8. Риск рождения ВИЧ-инфици. ребенка без профилактического лечения составляет...
  - 1- 20-40%.
  - 2- 3-6%
  - 3- 100 %
  - 4- 0%
9. При поступлении в стационар ВИЧ-инфицированного пациента необходимо:
  - 1 – иметь направление центра по профилактике и борьбе со СПИД
  - 2 – сообщить по телефону в центр по профилактике и борьбе со СПИД
  - 3 – временно отказать в оказании медицинской помощи до получения разрешения главного врача ЛПУ
  - 4 – обязательно поместить в отдельную палату
  - 5 – по возможности поместить в отдельную палату.
  - 6 – обеспечить соблюдение противоэпидемического режима согласно нормативным документам.
10. Обследоваться на ВИЧ-инфекцию можно...
  - 1- по направлению врача.
  - 2- анонимно.
  - 3- самостоятельно.
  - 4- только по показаниям

11. Лабораторные методы используемые для диагностики ВИЧ-инфекции...
- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1 – реакция связывания комплемента | 3 – иммуноблот.              |
| 2 – ПЦР.                           | 4 – иммуноферментный анализ. |
12. Максимальный срок хранения крови, предназначенной для исследования на ВИЧ в холодильнике при температуре от +4 до +8 °С...
- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1 – 3 часа   | 3 – 24 часа. |
| 2 – 12 часов | 4 – 48 часов |
13. Максимальный срок хранения сыворотки крови, предназначенной для исследования на ВИЧ, в холодильнике при температуре от +4 до +8 °С...
- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1 – 24 часа  | 3 – 5 суток  |
| 2 – 48 часов | 4 – 7 суток. |
14. На документации ВИЧ-инфицированного пациента делается отметка...
- |          |          |
|----------|----------|
| 1- В-20. | 3- В-24. |
| 2- В- 30 | 4- В-40  |
15. Правила обработки рук при загрязнении их кровью или сывороткой...
- |  |
|--|
| 1 – вымыть проточной водой, обработать 70 % спиртом                                    |
| 2 – обработать 70 % спиртом, вымыть проточной водой, повторно обработать 70 % спиртом. |
| 3 – обработать 70 % спиртом, повторно обработать 5 % йодом                             |
| 4 – вымыть проточной водой, обработать 5 % йодом                                       |
16. При нарушении целостности кожных покровов (порезы, уколы) необходимо...
- |   |
|---|
| 1 – выдавить из ранки кровь, снять перчатки, обработать 70 % спиртом                  |
| 2 – снять перчатки, выдавить кровь, обработать 70 % спиртом, затем 5 % йодом.         |
| 3 – снять перчатки, выдавить кровь, обработать 5 % йодом                              |
| 4 – выдавить из ранки кровь, снять перчатки, обработать 0,5 % марганцевокислого калия |
17. При нарушении целостности кожных покровов инструментом, «загрязненным» ВИЧ необходимо начать профилактическое лечение...
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1- не позднее 24 часов от момента аварии | 3- не позднее 72 часов. |
| 2- не позднее 2 часов                    | 4- не позднее 7 дней    |
18. Продолжительность курса профилактического лечения составляет...
- |                |               |                |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1- одна неделя | 2- две недели | 3- один месяц. | 4- два месяца |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
19. При обращении за медицинской помощью ВИЧ-инфицированный ...
- |  |  |
|--|--|
| 1- должен сообщить о своем ВИЧ-статусе | 3- не должен сообщать.                           |
| 2- должен, если предстоит операция     | 4- должен представить документ об отсутствии ВИЧ |
20. Ведущая мера профилактики ВИЧ-инфекции...
- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1- просвещение населения.      | 3- массовое обследование на ВИЧ-инфекцию |
| 2- изоляция ВИЧ-инфицированных | 4- лечение ВИЧ-инфицированных            |